



7+3 Sitarabin + Daunorubisin

Hasta Adı/ TC No:

Tanı:

Boy		Kür Sayısı	
Kilo		Hekim	
Düzeltilmiş Kilo		Kaşesi	
Yüzey Alanı			

İlaç	Gün	Tarih	Doz	Uygulama
Sitarabin	1.2.3.4.5.6.7.gün		100 mg/m ²	100- 1000 ml SF veya %5 Dx içinde 24 saatlik infüzyon
Daunorubisin	1.2.3.gün		60 mg/m ²	3-5 dk'dan daha uzun sürede iv
Valasiklovir 500 mg 1x1 tablet (tok) Posakonazol (nötrojeni boyunca) Kinolon (nötrojeni boyunca) Allopurinol 300 mg/m ² (mümkünse 3 bölünmüş dozda) (blastlar çevre kandan temizlenene kadar devam edilir, başlandıktan 48 saat sonra dozu ürik asit seviyesine göre ayarlanır. 300 mg/m ² başlangıç dozudur ve kemoterapiden 12 saat-3 gün önce başlanır.) 2500-3000 cc/m ² hidrasyon (AÇT takibi ile)				

Yan etki	Doz modifikasyonu
Kreatinin > 3 mg/dL	Daunorubisin dozu % 50 ↓
Bilirubin 2.5-5 mg/dL	Daunorubisin dozu % 50 ↓
Bilirubin >5 mg/dL	Daunorubisin uygulanmaz