



7+3+GO (2.konsolidasyon) Sitarabin + Daunorubisin + Gemtuzumab Ozogamisin

Hasta Adı/ TC No:

Tanı:

Boy		Kür Sayısı	
Kilo		Hekim	
Düzeltilmiş Kilo		Kaşesi	
Yüzey Alanı			

İlaç	Gün	Tarih	Doz	Uygulama
Sitarabin	1.2.3.4.gün		2×1 g/m ²	100- 1000 ml SF veya %5 Dx içinde >2 saatlik infüzyon (12 saat arayla)
Daunorubisin	1.2.gün		60 mg/m ²	3-5 dk'dan daha uzun sürede iv
Gemtuzumab Ozogamisin*	1.gün		3 mg/m ² (max 4.5mg)	En az 2 saatte SF içinde infüzyon (GO konsantrasyonu 0.075-0.234mg/mL arasında olmalı)(ışık görmemeli)
İndüksiyon tedavisinden sonraki 45 günde PLT <100.000mm ³ ise konsolidasyon tedavisinden GO çıkarılır.				
İlk sitarabin dozundan önce 6 saatte bir her 2 göze ikişer damla steroidli göz damlası başlanır ve sitarabin dozları tamamlandıktan 48 saat sonrasına kadar devam edilir.				
Gemtuzumab Ozogamisin başlanmadan önce premedikasyon: Metilprednizolon 1 mg/kg her GO uygulamasından 30 dk önce iv uygulanır. Asetaminofen 650 mg oral her GO uygulamasından 1 saat önce uygulanır. Difenhidramin 50 mg her GO uygulamasından 1 saat önce oral veya iv uygulanır.				
Valasiklovir 500 mg 1x1 tablet (tok) Posakonazol (nötropeyi boyunca) Kinolon (nötropeyi boyunca) Allopurinol 300 mg/m ² (mümkünse 3 bölünmüş dozda) (blastlar çevre kandan temizlenene kadar devam edilir, başlandıktan 48 saat sonra dozu ürik asit seviyesine göre ayarlanır. 300 mg/m ² başlangıç dozudur ve kemoterapiden 12 saat-3 gün önce başlanır.) 2500-3000 cc/m ² hidrasyon (AÇT takibi ile)				

Yan etki	Doz modifikasyonu
Kreatinin > 3 mg/dL	Daunorubisin dozu % 50 ↓
CrCl 46-60 mL/dk	Her bir sitarabin dozu 600mg/m ² 'ye inilir.
CrCl 31-45 mL/dk	Her bir sitarabin dozu 500mg/m ² 'ye inilir.
CrCl <30 mL/dk	Sitarabin verilmez.
Bilirubin 2.5-5 mg/dL	Daunorubisin dozu % 50 ↓
Bilirubin >5 mg/dL	Daunorubisin uygulanmaz
Total bilirubin >2×ULN veya AST>2.5×ULN veya ALT >2.5×ULN	Gemtuzumab ozogamisine total bilirubin ≤2×ULN veya AST≤2.5×ULN veya ALT ≤2.5×ULN olana kadar ara ver. 2 günden fazla gecikme olursa o doz atlanır.
Önceki kemoterapinin hematolojik iyileşmesinden sonraki 14 günde persistan trombositopeni (PLT<100.000/mm ³)	Konsolidasyonda GO verme.
Önceki kemoterapinin hematolojik iyileşmesinden sonraki 14 günde persistan nötropeni (ANS<500/mm ³)	Konsolidasyonda GO verme.