



ANAGRELİD REJİMİ

Hasta Adı/ TC No:

POLİSİTEMİA VERA VE ESANSİYEL TROMBOSİTEMİ

Boy		Kür Sayısı	
Kilo		Hekim	
Düzeltilmiş Kilo		Kaşesi	
Yüzey Alanı			

İlaç	Doz	Uygulama ve Tedavideki Yeri	Tedavi Modifikasyonu
Anagrelid	Başlama dozu: 0.5 mg / gün, oral yolla 12 saatte bir, 7 gün boyunca. İdame dozu: 1 haftalık günde iki kez 0.5 mg dozundan sonra, haftalık olarak günlük doz 0.5 mg arttırılır. Optimal doz ampirik olarak bulunur. Trombosit sayıları yakından izlenmelidir.	Genellikle toplam günlük doz 2-2.5 mg olup dozlar 2-4'e bölünebilir. Bölünen dozların eşit olmasına gerek yoktur. Her doz alımında 0.5-1 mg arası alınır. Tek alımda alınan maksimum doz 2.5 mg, günlük toplam maksimum doz 10 mg'dır.	Hematolojik Toksisite Trombosit $<100.000/\text{mm}^3$, anagrelide ara verilir, trombosit $100.000/\text{mm}^3$ üzerine çıkınca önceki kullanılan dozun yarısından yeniden başlanır. Hematoloji dışı toksisite Düzen-1: Doz değişimine gerek yok Düzen 2-3: Düzen-1 seviyesine düşene kadar ara ver, daha sonra önceki dozdan yeniden başla Tekrarlayan Düzen 2-3: Düzen-1 seviyesine düşene kadar ara ver, daha sonra önceki dozun %75'nden yeniden başla Düzen 4: Düzen-1 seviyesine düşene kadar ara ver, daha sonra önceki dozun %50'nden yeniden başla Tekrarlayan Düzen-4: Anagrelidi kes.

Tedavi İzlemi	
Başlangıçta	Trombosit sayısı 5-7 günde bir izlenmelidir.
Kan sayımları stabil anagrelid dozlarıyla kontrol altında	İzlem sıklığı önce 2 haftada bir sonra 4 haftada bir çıkılmalıdır.