



ATRA+ ATO (KONSOLİDASYON)

Hasta Adı/ TC No:

Tanı:

Boy		Kür Sayısı	
Kilo		Hekim	
Düzeltilmiş Kilo		Kaşesi	
Yüzey Alanı			

İlaç	Gün	Tarih	Doz	Uygulama
Arsenik trioksit	5 gün/hafta, 4 ardışık hafta boyunca (1-4, 9-12, 17-20 ve 25-28. haftalar)		0,15 mg/kg	100-250 mL %0,9 SF veya %5 dekstroz içinde 2 saat boyunca
Tretinoin	ardışık 2 hafta boyunca, (1-2, 5-6, 9-10, 13-14, 17-18, 21-22 ve 25-26. haftalarda)		22,5 mg/m ²	Oral yolla, günde iki kez

Sadece uzun süreli nötropeni dönemlerinde (örn. ≥ 7 gün boyunca $<500/\text{mm}^3$) antibakteriyel profilaksi (örn. kotrimoksazol) düşünün

Arsenik trioksit ile QTc uzaması riski nedeniyle profilaksi için florokinolonların rutin kullanımından kaçınılması gerektiğini unutmayın

Sadece uzamış nötropeni dönemlerinde (örn. ≥ 7 gün boyunca $<500/\text{mm}^3$) ekinokandin (örn. kaspofungin) ile profilaksi düşünün

Arsenik trioksit ile QTc uzaması riski nedeniyle profilaksi için azol antifungallerin (örn. flukonazol) rutin kullanımından kaçınılması gerektiğini unutmayın

Uzun süreli prednizon tedavisi sırasında Pneumocystis jirovecii profilaksisi önerilir (örn. kotrimoksazol)

Antiherpes antiviralleri (örn. asiklovir, famsiklovir, valasiklovir) ile profilaksi düşünün

ATO tedavisi sırasında haftada 1-2 kez hemogram ve karaciğer fonksiyon testleri (ALT, AST, total bilirubin ve alkalın fosfataz), her 2-4 haftada bir açlık lipid paneli alın

Kardiyak izleme (ATO tedavisi sırasında hedef QTc <500 msn):

ATO tedavisi sırasında serum potasyum konsantrasyonunu >4 mEq/L (>4 mmol/L) ve serum magnezyum konsantrasyonunu $>0,74$ mmol/L ($>1,8$ mg/dL, $>1,48$ mEq/L) olmasını sağlayın

ATO tedavisi sırasında her kürden önce ve haftada en az iki kez EKG

Konsolidasyon tedavisi bitiminde moleküler yam yanıtı dokümanete etmek için kemik iliği örneğinden PCR testi. Moleküler tam remisyonun elde edilmesini takip eden ilk yıl boyunca aylık olarak ve daha sonra 2 yıl boyunca her 3-4 ayda bir hemogram ile değerlendirin