



ATRA+ İDARUDİSİN(İNDÜKSİYON)

Hasta Adı/ TC No:

Tanı:

Boy		Kür Sayısı	
Kilo		Hekim	
Düzeltilmiş Kilo		Kaşesi	
Yüzey Alanı			

İlaç	Gün	Tarih	Doz	Uygulama
Tretinoin	hematolojik tam remisyon elde edilinceye kadar		22,5 mg/m ²	Oral yolla, günde iki kez
Idarubisin	2., 4., 6. ve 8. günlerde		12 mg/m ²	%0,9 SF enjeksiyonu veya %5 dekstroz enjeksiyonu içinde 15-30 dakika boyunca intravenöz 4 doz halinde

Sadece uzun süreli nötropeni dönemlerinde (örn. ≥ 7 gün boyunca $<500/\text{mm}^3$) antibakteriyel profilaksi (örn. kinolon) düşünün

Sadece uzamış nötropeni dönemlerinde (örn. ≥ 7 gün boyunca $<500/\text{mm}^3$) antifungal (örn. flukonazol) ile profilaksi düşünün

Antiherpes antiviralleri (örn. asiklovir, famsiklovir, valasiklovir) ile profilaksi düşünün

Total bilirubin >3 mg/dL olduğunda İdarubisin dozunu %25 azaltın

Psödotümör serebri (bulantı, kusma ve görme bozukluklarıyla birlikte şiddetli baş ağrıları; çocuk hastalarda daha sık görülür) gelişirse baş ağrısı ile ilişkili ağrıyı yönetin ve semptomlar düzeline kadar ATRA'yı geçici olarak kesin.

Sadece **ŞİDDETLİ** farklılaşma sendromu vakalarında ATRA ile tedaviyi durdurun. Yeni başlayan farklılaşma sendromunun en erken klinik şüphesinde, belirti/semptomlar ortadan kalkıncaya kadar ve en az 3 gün süreyle her 12 saatte bir 10 mg IV deksametazon tedavisine derhal başlayın. Klinik olarak gerekli olduğunda loop diüretikleri (örn. furosemid) ile tedaviyi düşünün.