

	Bortezomib idame		
	Hasta Adı/ TC No:		
	Tanı:		
	Boy		Kür Sayısı
Kilo		Hekim	
Düzeltilmiş Kilo		Kaşesi	
Yüzey Alanı			

İlaç	Gün	Tarih	Doz	Uygulama
Bortezomib*	1.gün		1.3 mg/m ²	sc
*Yüksek doz melfalandan 4 hafta sonra başlanır.				
2 haftada bir uygulanır.				
Valasiklovir 500 mg 1x1 tablet (tok)				

Periferik nöropati derecesi	Bortezomib yönetimi
Ağrı ya da fonksiyon kaybı olmadan parestezi gelişmesi ya da reflekslerin kaybı	1,3 mg/m ²
Ağrı ile birlikte parestezi ya da günlük yaşamı etkilemeyen fonksiyon kaybı	Bortezomib dozu 1,0 mg/m ² /gün verilir.
Ağrı ile birlikte günlük yaşamı etkilemeyen fonksiyon kaybı veya günlük yaşamın etkilenmesi	Bortezomib kesilir. Belirtiler tamamen kaybolursa bortezomib haftada bir 0,7 mg/m ² /gün olarak başlanır.
Fonksiyon kaybına yol açan kalıcı his kaybı	Bortezomib tamamen kesilir.

Bortezomib
Böbrek Yetmezliği
Doz ayarlaması gerekli değildir. Uluslararası Miyelom Çalışma Grubu (IMWG) önerileri, bortezomibin diyaliz hastaları da dahil olmak üzere böbrek yetmezliği olan hastalara güvenli bir şekilde uygulanabileceğini öne sürmektedir. Diyaliz bortezomib konsantrasyonlarını azaltabilir; diyaliz sonrası uygulanmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Tedaviye başlamadan önce karaciğer yetmezliği: Hafif bozukluk (bilirubin ≤ ULN ve AST > ULN veya bilirubin > 1 ila 1,5 kat ULN ve herhangi bir AST): Başlangıçta doz ayarlaması gerekli değildir.
Orta (bilirubin > 1,5 ila 3 kat ULN ve herhangi bir AST) ve şiddetli bozukluk (bilirubin > 3 kat NÜS ve herhangi bir AST): İlk döngüde başlangıç dozunu 0,7 mg/m ² 'ye düşürün;

Hastanın toleransına baęlı olarak, sonraki siklularda dozun 1 mg/m²'ye yükseltilmesi veya 0,5 mg/m²'ye daha fazla doz azaltılması düşünölebilir.

Obez Hastalarda Doz Ayarlaması

BMI ≥30 kg/m²: BSA veya aęırlıęa dayalı doz hesaplaması için hastanın gerçek vücut aęırlıęı kullanılır.