

 HEMATOLOJİ ÜNİVERSİTESİ	CHOP		
	SİKLOFOSFOMİD,DOKSORUBİSİN,VİNCRİSTİN,PREDNİSON		
	Hasta Adı/ TC No:		
	Tanı:		
Boy		Kür Sayısı	
Kilo		Hekim	
Düzeltilmiş Kilo		Kaşesi	
Yüzey Alanı			

İlaç	Gün	Tarih	Doz	Uygulama
Siklofosfamid	1.gün		750 mg/m ²	Siklofosfamid uygulamasından önce ve sonra iv hidrasyon: 500 mL %0,9 SF uygulanır. 500 mL %0,9 sodyum klorür içinde 30 dakika boyunca iv bolus veya iv infüzyon uygulanır.
Doksorubisin	1.gün		50 mg/m ²	Doksorubisin 150 cc %5 Dx içinde 1 saatlik iv infüzyonla uygulanır. Yüksek riskli hastalarda dekstrazoksan düşünülmelidir.
Vinkristin	1. gün		1.4 mg/m ²	50 mL %0,9 SF içinde 10 dakika süreyle iv infüzyon yoluyla uygulanır. Vinkristin maksimum 2 mg dozunda verilir. 70 yaşın üzerindeki hastalarda maximum vinkristin 1 mg verilir.
Prednizon (*Metilprednizolon)	1.2.3.4.5gün		40 mg/m ² (*32mg/m2)	Prednizon (metilprednizolon) ardı ardına 5 gün boyunca, her 3 haftada bir 1-5.

				günler boyunca oral ve tok olarak uygulanır. (İlk dozu premedikasyon olarak rituksimab'dan önce verilir)
21 günde bir uygulanır.				
Premedikasyon				
Hidrasyon: 500-1000 ml %0.9 NaCl siklofosfamid öncesi				
Trimetoprim sulfometaksazol tb. 2x1 (haftada 2 gün) (tok) Flukonazol 200 mg 1x1 tablet (nötropeni döneminde) Valasiklovir 500 mg 1x1 tablet (tok) Proton pompa inhibitörü 1x1 tablet				

DOZ	Siklofosfamid	Doksorubicin	Vincristin	Prednison
Başlangıç	750 mg/m²	50 mg/m²	1.4 mg/m²	40 mg/m²
Seviye 1	562.2 mg/m²	37.5 mg/m²	1.05 mg/m²	30 mg/m²
Seviye 2	375 mg/m²	25 mg/m²	0.7 mg/m²	20 mg/m²

Doz Modifikasyonları:

1. Gün trombosit < 100000 mm³ veya ANC < 1500 / mm³ tedaviyi trombosit >100000 ANC >1500 olana kadar erteleyin.
2. Grade 4 nötropeni , febril nötropenide GCSF profilaksi verin ve aynı dozda devam edin.

Grade 3 trombositopeni trombosit <50000/mm ³ Febril nötropeni	Siklofosfamid ve doksorubicin dozunu 1 seviye azaltın
Grade 3 ileus ve veya grade 3 konstipasyon	Semptomlar çözülene kadar tüm kemoterapi durdurulur.sonrasında vincristin dozu seviye 1 düzeyinde azaltılır. Uygun diyet ve azaltılmış vincristin dozunda şikayetleri olmazsa doz artırılabilir.
Grade 3 periferik duysal nöropati Grade 2 periferik motor nöropati	Tedaviye devam edilip vincristin dozu seviye 1 ye azaltılır.
Grade 3 periferik motor nöropati	Tedaviye devam edilip vincristin dozu seviye 2 ye azaltılır.
Grade 4 periferik duysal nöropati Grade 4 periferik motor nöropati	Vincristin kesilir.
Grade 2 duygudurum bozukluğu veya konfüzyon	Semptomlar başlangıç düzeyine dönene kadar prednisonu kesin.sonrasında prednisonu seviye 1 dozunda azaltın.
Serum bilirubin 1.2-3 mg/dL	Doksorubisin dozunu %50 azaltın . Serum bilirubin 1.5-3 mg/dL İse vincristin dozunda %50 azaltın

Serum bilirubin 3.1-5 mg/dL	Doksorubisin dozunu 575 azaltın ,vincristin vermeyin
Serum bilirubin >5 mg/dL	Doksorubisin ve vincristin vermeyin