

	HIDAC Yüksek doz sitarabin		
	Hasta Adı/ TC No:		
	Tanı:		
	Boy		Kür Sayısı
Kilo		Hekim	
Düzeltilmiş Kilo		Kaşesi	
Yüzey Alanı			

İlaç	Gün	Tarih	Doz	Uygulama
Sitarabin	1.3.5.gün		2×3 g/m ²	100- 1000 ml SF veya %5 Dx içinde en az 3 saatlik infüzyon (12 saat arayla)
İlk sitarabin dozundan önce 6 saatte bir her 2 göze ikişer damla steroidli göz damlası başlanır ve sitarabin dozları tamamlandıktan 48 saat sonrasına kadar devam edilir.				
Diğer siklus 28 günden önce başlanamaz. ≤35 gün olmak üzere ANS >1000/mm ³ ve PLT >100.000/mm ³ olduktan bir hafta sonra diğer siklus başlanır.				
Valasiklovir 500 mg 1x1 tablet (tok)				
Antifungal (nötropeni boyunca)				
Kinolon (nötropeni boyunca)				

Kreatinin	Sitarabin dozu
<1.5 mg/dL	2000 mg/m ²
1.5-1.9 mg/dL veya bazale göre 0.5-1.2 mg/dL artış	1000 mg/m ²
≥2 mg/dL veya >1.2 mg/dL artış	100 mg/m ² /gün, 6 güne kadar, 24 saatlik infüzyon ile