

 HEMATOLOJİ ÜNİVERSİTESİ	IBRUTINIB- VENETOKLAKS		
	Hasta Adı/ TC No:		
	Tanı:		
Boy		Kür Sayısı	
Kilo		Hekim	
Düzeltilmiş Kilo		Kaşesi	
Yüzey Alanı			

İlaç	Gün	Tarih	Doz	Uygulama
Ibrutinib	Hastalık progrese olana kadar		560 mg/doz	Oral
Venatoklaks	5. haftada başlanıp progresyona kadar devam edilir.		5.hafta -50mg 6.hafta -100 mg 7.hafta -200 mg 8.hafta ve sonrası-400 mg	Oral
28 günde bir uygulanır.				

İBRUTİNİB DOZ MODİFİKASYONU

CYP3A inhibitörü kullanımı gerekirse	Tedavi dozu 280 mg a düşürülür.
Vorikonazol 200 mg ,posakonazol 100-200 mg günde 1 defa kullanım gerekiyorsa	Tedavi dozu 140 mg a düşürülür.
Posakanozol 200 mg günde 3 doz, posakanozol 400 mg günde 2 doz,posakanozol 300 mg iv günde 1 defa kullanımı	Tedavi 70 mg a düşürülür.
Antikoagülan yada antiagregan kullanımı	Kanama riski artabilir.yakın takip edilmelidir.
Child A hepatik yetmezlik	İbrutinib 140 mg a düşürülür.

Child B hepatik yetmezlik	İbrutinib 70 mg a düşürülür.
Child C hepatik yetmezlik	İbrutinib kesilir.
Cerrahi operasyon olacaksa	İbrutinib e 3-7 gün ara verilip kanama açısından dikkat edilmelidir.
İlk grade 3 non hematolojik toksisite, grade 3 nötropeniye eşlik eden ateş veya enfeksiyon grade 4 hematolojik toksisite	İbrutinibe ara verilir.semptomlar grade 1 e gerileyince aynı dozdan devam edilir.
İkinci grade 3 non hematolojik toksisite, grade 3 nötropeniye eşlik eden ateş veya enfeksiyon grade 4 hematolojik toksisite	İbrutinibe ara verilip semptomlar grade 1 e gerileyince ibrutinib 420 mg dozdan verilir.
Üçüncü grade 3 non hematolojik toksisite, grade 3 nötropeniye eşlik eden ateş veya enfeksiyon grade 4 hematolojik toksisite	İbrutinibe ara verilip semptomlar grade 1 e gerileyince ibrutinib 280 mg dozdan verilir.
Dördüncü grade 3 non hematolojik toksisite, grade 3 nötropeniye eşlik eden ateş veya enfeksiyon grade 4 hematolojik toksisite	İbrutinib kesilir.
Gebelik	Fetal zararı olduğu için kullanılırken gebe kalınmamalıdır. Gebelik planlanıyorsa 1 ay önce kesilmelidir.