



LENALİDOMİD REJİMİ

Hasta Adı/ TC No:

PRİMER MYELOFİBROZİS

Boy		Kür Sayısı	
Kilo		Hekim	
Düzeltilmiş Kilo		Kaşesi	
Yüzey Alanı			

İlaç	Doz	Uygulama ve Tedavideki Yeri	Trombofilaksi
Lenalidomid	10 mg/gün	10 mg/gün dozunda 28 gün boyunca verilir. Tedavi süresi 3-4 aydır. Trombosit sayısı $<100.000/\text{mm}^3$ ise 5 mg / gün dozunda başlanır. Tedavi, eğer hasta yanıt veriyorsa 6-24 aya uzatılabilir.	Primer profilaksi endike değildir. Hastalara nefes darlığı, göğüs ağrısı veya bacak-kol şişliği olması durumunda başvurması konusunda bilgi verilmelidir. Trombofilaksi konusunda hasta bazında risk durumuna göre karar verilmelidir.

Tedavi Modifikasyonları

Yan etki	Tedavi modifikasyonu
Trombosit sayısı $<30000/\text{mm}^3$, lenalidomid 10 mg/gün alırken	Lenalidomidi kes. Haftalık olarak hemogram takibi yap ve trombosit $>30000/\text{mm}^3$ olduğunda 5 mg/gün ile tedaviye dönülebilir.
Trombosit sayısı $<30000/\text{mm}^3$, lenalidomid 5 mg/gün alırken	Lenalidomidi kes.
ANC $<1000/\text{mm}^3$, lenalidomid 10 mg/gün ile	Lenalidomidi kes. Haftalık olarak hemogram takibi yap ve ANC $>1000/\text{mm}^3$ olduğunda 5 mg/gün ile tedaviye dönülebilir.

ANC<1000/mm ³ , lenalidomid 5mg/gün ile	Lenalidomidi kes.
Febril nötropeni, lenalidomid 10 mg/gün ile	Lenalidomidi kes. Yakın takip edilir, ateş ortadan kalktığında 5 mg/gün ile tedaviye dönülebilir
Febril nötropeni, lenalidomid 5 mg/gün ile	Lenalidomidi kes.
Seviye 3-4 hematoloji dışı yan etki ,lenalidomid 10mg/gün ile	Lenalidomide ara ver, klinik olarak izle, eğer toksisite seviye 2 ve altına düşerse 5 mg / gün dozundan tedaviye yeniden başla
Seviye 3-4 hematoloji dışı yan etki ,lenalidomid 5mg/gün ile	Lenalidomidi kes
	Hastalar nötropeni riskine karşı sık aralıklarla izlenmelidir.

Destek Tedavi
Antiemetik profilaksi
1. Emetik potansiyeli düşüktür.
Hematopoietik Büyüme Faktörleri
1. Primer profilaksi endike değildir
Antimikrobiyal Profilaksi
1. Ateş ve nötropeni riski düşüktür
- Antibakteriyel : P.jirovecii profilaksisi önerilir. (kotrimaksazol ile)
- Antifungal :endike değil
- Antiviral :Eğer hasta daha önce HSV enfeksiyonu geçirmemişse endike değildir.