

	LENALİDOMİD		
	Hasta Adı/ TC No:		
	Tanı:		
Boy		Kür Sayısı	
Kilo		Hekim	
Düzeltilmiş Kilo		Kaşesi	
Yüzey Alanı			

İlaç	Gün	Tarih	Doz	Uygulama
Lenalidomid	1-21. gün		Kr Kl >60 mL/dk 25 mg Kr Kl 30- 60 mL/dk 10 mg	Oral 1-21. Günler sonrası 7 gün alınmaz (28 günde bir)
28 günde bir uygulanır.				

LENALİDOMİD DOZ MODİFİKASYONU

Başlangıç dozu	25 mg
Seviye 1	20 mg
Seviye 2	15 mg
Seviye 3	10 mg
Seviye 4	5 mg
Seviye 5	verilmez

Doz modifikasyonları	
Tedavinin 1. Gününde ANC<1000 /mm ³ ,ancak trombosit <50000/mm ³	Trombosit >50000/mm ³ ANC >1000 olana kadar tedavi ertelenir.>14 günden bu değerlere ulaşırsa lenalidomid dozu 1 seviye azaltılır.
7 günden uzun grade 3	15 günden sonra nötropeniden çıkarsa lenalidomide ara

nötropeni Grade 4 nötropeni herhangi bir zamanda Febril nötropeni	verilip haftalık hemogram takibi yapılır. 15 günden önce nötropeniden çıkarsa lenalidomide aynı dozda devam edilir. Bir sonraki siklusta lenalidomid 1 seviye azaltılır.
Grade 3 trombositopeni herhangi bir zamanda	15 günden sonra trombositopeniden çıkarsa lenalidomide ara verilip haftalık hemogram takibi yapılır. 15 günden önce trombositopeniden çıkarsa lenalidomide aynı dozda devam edilir. Bir sonraki siklusta lenalidomid 1 seviye azaltılır
Grade 2/3 desukuamatif olmayan rash	Lenalidomid ara verilir. Grade 1'e gerilediğinde başlanır.
Grade 3 desukuamatif rash Grade 4 desukuamatif olmayan rash Steven jhonson ,TEN	Lenalidomid kalıcı olarak kesilir.
TLS	Yakın takip,hidrasyon,allopurinol verilir.
Grade 3 periferel nöropati	Nöropati 15 günden sonra olmuşsa ve lenalidomide kaynaklı ise, ilaç kesilip haftalık takip edilir. Nöropati 15 günden önce olup, lenalidomide nedenli ise, ilaca ara verilip semptomlar grade 1 e gerilerse aynı dozdan devam edilir. Takip eden diğer siklusta lenalidomid düzeyi 1 seviye azaltılır.
Grade 3 / 4 VTE aspirin altında ve antikoagülan almayan hasta	Antikoagülan eklenir. Lenalidomid aynı dozdan devam edilir.
Grade 3 /4 VTE antikoagülan kullanan hasta	Lenalidomid kesilir.
Grade 2 hipo/ hipertiroidi	Lenalidomid devam edilir.
AST,ALT ,serum bilirubin > 3 × ULN	15 günden sonra olmuşsa lenalidomid kesilir. ALT,AST <2.5 × ULN,bilirubin <1.5 oluna kadar takip edilir. 15 günden önce olmuşsa ALT,AST <2.5 × ULN,bilirubin <1.5 olunca aynı dozdan devam edilir. Bir sonraki siklus 1 seviye azaltılıp başlanır.
Diğer grade 3 lenalidomid ilişkili toksisite	Toksisite 15 günden sonra olmuşsa lenalidomid verme,toksisite 15 günden önce olmuşsa gerileyince aynı dozdan devam edip ,bir sonraki siklustadozu 1 seviye azaltıp devam edilir.
Kreatin klirensi 30-60 mL/dakika	Lenalidomid 10 mg dozunda başlanır.idame tedavide 5 mg dozunda verilri.