

	Lenalidomid İdame		
	Hasta Adı/ TC No:		
	Tanı:		
	Boy		Kür Sayısı
Kilo		Hekim	
Düzeltilmiş Kilo		Kaşesi	
Yüzey Alanı			

İlaç	Gün	Tarih	Doz	Uygulama
Lenalidomid	İlk 21 gün		10 mg	oral
Yüksek doz melfalandan 100 gün sonra 10 mg başlanır. Tolere edebilen hastalarda doz daha sonra 15 mg'a yükseltilebilir. Progresyona kadar devam edilir.				
28 günde bir uygulanır.				

Lenalidomid yemekle bağımsız, her gün aynı saatte.

IMiD tedavisi altında tromboz risk faktörleri		
Hasta kaynaklı risk faktörleri Enfeksiyon Cerrahi VTE öyküsü Aktif hastalık Kardiyovasküler hastalık İmmobilizasyon İleri yaş, obezite Trombofili Hipervizkozite		Tedavi kaynaklı risk faktörleri Yüksek doz deksametazon Eritropoetin Doksorubisin Hormon tedavisi Çoklu kemoterapi kombinasyonu
0-1	≥2	DMAH veya warfarin
Aspirin	DMAH veya warfarin	
Düşük riskli = hasta kaynaklı risk faktörü yok veya bir tane mevcut, tedavi kaynaklı risk faktörü yok; Yüksek riskli = hasta kaynaklı risk faktörü birden fazla veya tedavi kaynaklı risk faktörü mevcut		

VTE, venöz tromboemboli; DMAH, düşük moleküler ağırlıklı heparin

Böbrek fonksiyonuna göre lenalidomid doz ayarlaması

Böbrek fonksiyonu (CrCl)	Doz ayarlaması
Orta derecede böbrek bozukluğunda (30≤CrCl<50 mL/dk)	Günde bir defa 10 mg (Eğer hasta tedaviye cevap vermiyorsa ve

	tedaviyi tolere ediyorsa, 2 siklus sonra doz günde bir defa 15 mg'a yükseltilebilir)
Ağır derecede böbrek bozukluğunda (CrCl<30 mL/dk, diyaliz gerektirmeyen)	Günde bir defa 7,5 mg veya gün aşırı 15 mg
Son evre böbrek yetmezliği (CrCl<30 mL/dk, diyaliz gerektiren)	Günde bir defa 5 mg Diyaliz günlerinde doz, diyalizden sonra uygulanmalıdır.