

NORDİC REJİMİ SİKLUS 1 : MAXİ CHOP, SİKLUS 2/SİKLUS 4 : R-HİDAC (2-4) ,
SİKLUS 3:R-MAXİCHOP, SİKLUS 6: R-HİDAC 6

 HEMATOLOJİ ÜNİVERSİTESİ	MAXİ CHOP SİKLUS 1 SİKLOFOSFOMİD, DOKSORUBİSİN,VİNCRİSTİN,PREDNİSON		
	Hasta Adı/ TC No:		
	Tanı:		
	Boy		Kür Sayısı
Kilo		Hekim	
Düzeltilmiş Kilo		Kaşesi	
Yüzey Alanı			

İlaç	Gün	Tarih	Doz	Uygulama
Siklofosfamid	1.gün		1200 mg/m ²	İv .25-250 ml %0.9 sf veya %5 dekstroz içerisinde 10-30 dakika da gidecek şekilde
				50-100 ml %0.9 sf veya %5 dekstroz içerisinde 15 dakika da gidecek şekilde
Doksorubicin	1.gün		75 mg/m ²	Doksorubisin 150 cc %5 Dx içinde 1 saatlik iv infüzyonla uygulanır. Yüksek riskli hastalarda dekstrazoksan düşünülmelidir.
Vincristin	1. gün		1.4 mg/ m ² (max 2 mg)	50 ml %0.9 sf içinde 15 dakikada
Prednison	1.2.3.4.5.gün		100 mg	Oral
21 günde bir uygulanır.				
Premedikasyon				
Hidrasyon: 500-1000 ml %0.9 NaCl				

NORDİC REJİMİ SİKLUS 1 : MAXİ CHOP, SİKLUS 2/SİKLUS 4 : R-HİDAC (2-4) ,
SİKLUS 3:R-MAXİCHOP, SİKLUS 6: R-HİDAC 6

Trimetoprim sulfometaksazol tb. 2x1 (haftada 2 gün) (tok)
Flukonazol 200 mg 1x1 tablet (nötropeni döneminde)
Valasiklovir 500 mg 1x1 tablet (tok)
Proton pompa inhibitörü 1x1 tablet

DOZ	Siklofosfamid	Doksorubicin	Vincristin	Prednison
Başlangıç	1200 mg/m ²	75 mg/m ²	2 mg	100 mg
Seviye 1	1000 mg/m ²	60 mg/m ²	1.5 mg	80 mg
Seviye 2	800 mg/m ²	45 mg/m ²	1 mg	60 mg

1. Gün trombosit < 100000 mm³ veya ANC < 1500 / mm³ tedaviyi trombosit >100000 ANC >1500 olana kadar erteleyin.
2. Grade 4 nötropeni ,febril nötropenide GCSF profilaksi verin ve aynı dozda devam edin.

Grade 3 trombositopeni trombosit <50000/mm ³	Siklofosfamid ve doksorubicin dozunu 1 seviye azaltın
Grade 3 ileus ve veya grade 3 konstipasyon	Semptomlar çözülene kadar tüm kemoterapi durdurulur.sonrasında vincristin dozu seviye 1 düzeyinde azaltılır. Uygun diyet ve azaltılmış vincristin dozunda şikayetleri olmazsa doz artırılabilir.
Grade 3 periferel duyuşal nöropati Grade 3 periferel motor nöropati	Tedaviye devam edilip vincristin dozu seviye 2 ye azaltılır.
Grade 4 periferel duyuşal nöropati Grade 4 periferel motor nöropati	Vincristin kesilir.
Grade 2 duyğudurum bozukluğı veya konfüzyon	Semptomlar başlangıç düzeyine dönene kadar prednisonu kesin.sonrasında prednisonu seviye 1 dozunda azaltın.
Serum bilirubin 1.2-3 mg/dL	Doksorubisin dozunu %50 azaltın . Serum bilirubin 1.5-3 mg/dL İse vincristin dozunda %50 azaltın
Serum bilirubin 3.1-5 mg/dL	Doksorubisin dozunu 575 azaltın ,vincristin vermeyin
serum bilirubin >5 mg/dL	Doksorubisin ve vincristin vermeyin

NORDIC REJIMI SIKLUS 1 : MAXI CHOP, SIKLUS 2/SIKLUS 4 : R-HIDAC (2-4) ,
SIKLUS 3:R-MAXICHOP, SIKLUS 6: R-HIDAC 6