

NORDİC REJİMİ SİKLUS 1 : MAXİ CHOP, SİKLUS 2/SİKLUS 4 : R-HİDAC (2-4) ,
SİKLUS 3:R-MAXİCHOP, SİKLUS 6: R-HİDAC 6

 HEMATOLOJİ ÜNİVERSİTESİ	R-HİDAC (SİKLUS 6) RİTUKSİMAB,YÜKSEK DOZ SİTARABİN		
	Hasta Adı/ TC No:		
	Tanı:		
Boy		Kür Sayısı	
Kilo		Hekim	
Düzeltilmiş Kilo		Kaşesi	
Yüzey Alanı			

İlaç	Gün	Tarih	Doz	Uygulama
Rituksimab	1.ve 9.gün		375 mg/m ²	İv . %0.9 sf veya %5 dekstroz içerisinde 1-4 mg/ml olacak şekilde dilue edilecek İlk inf 50 mg/saat alerjik reaksiyon gelişmezse her 30 dk da bir 50 mg/saat artırıp en fazla 400 mg/saate çıkılabilir
Sitarabin	1.2.gün		Yaş<60 3000 mg/m ² Yaş >60 2000 mg/m ²	50-500 ml %0.9 sf veya %5 dekstroz içerisinde 3 saatlik infüzyon12 saatte bir
21 günde bir uygulanır.				
Rituksimab öncesi premedikasyon:				
Asetaminofen : 600-1000 mg po tedaviden 30-60 dakika önce				
Difenhidramin: 25-30 mg po/iv				
Rituksimab infüzyon reaksiyonu gelişirse				

NORDİC REJİMİ SİKLUS 1 : MAXİ CHOP, SİKLUS 2/SİKLUS 4 : R-HİDAC (2-4) ,
SİKLUS 3:R-MAXİCHOP, SİKLUS 6: R-HİDAC 6

Asetaminofen : 400-600 mg oral 4-6 saatte bir (ateş için)

Difenhidramin : 25-50 mg oral yada iv 4-6 saatte bir (kaşıntı,hipotansiyon ,anjioödem için)

Meperidin :12.5-25 mg iv 10-20 dk da bir (titreme için)

Ciddi alerjik reaksiyonda ilaç infüzyonu kesilmeli ,

Hidrokortizon : 100 mg iv

H2 reseptör antagonisti: simetidin 300 mg /famotidin 20 mg / ranitidin 60 mg 15-30 dk boyunca iv

Semptomlar azalınca infüzyon 25 mg/ saatten yakın monitörizasyon ile başlanılır.

Keratit profilaksisi : steroidli göz damlası 6 saatte bir sitarabin başlanmadan başlanıp ,bittikten sonra 48 saat sonraya kadar devam edilir.

Trimetoprim sulfometaksazol tb. 2x1 (haftada 2 gün) (tok)

Flukonazol 200 mg 1x1 tablet (nötropeni döneminde)

Valasiklovir 500 mg 1x1 tablet (tok)

Proton pompa inhibitörü 1x1 tablet

HİDAC DOZ MODİFİKASYONU

	YAŞ < 60	YAŞ >60
BAŞLANGIÇ DOZU	3000 mg/m²	2000mg/m²
SEVİYE 1 DOZ	2250 mg/m²	1500mg/m²
SEVİYE 2 DOZ	1500 mg/m²	1000mg/m²

- 1. 1.Gün trombosit < 100000 mm³ veya ANC < 1500 / mm³ tedaviyi trombosit >100000 ANC >1500 olana kadar erteleyin.**
- 2. Grade 4 nötropeni ,febril nötropenide GCSF profilaxi verin ve aynı dozda devam edin.**

NORDİC REJİMİ SİKLUS 1 : MAXİ CHOP, SİKLUS 2/SİKLUS 4 : R-HİDAC (2-4) ,
SİKLUS 3:R-MAXİCHOP, SİKLUS 6: R-HİDAC 6

Grade 3 trombositopeni trombosit <50000/mm ³ Febril nötropeni	Sitarabin dozunu seviye 1 e düşürün
Nörolojik (serebellar) toksisite	Sitarabin kesilir.
İlaç uygulandıktan 6-12 saat sonra ateş miyalji döküntü (ara-c sendromu)	Kortikosteroidler verilir. Semptomlar önlenebilirse sitarabin seviyesi 1.seviyeye azaltılıp verilir.

NORDIC REJIMI SIKLUS 1 : MAXI CHOP, SIKLUS 2/SIKLUS 4 : R-HIDAC (2-4) ,
SIKLUS 3:R-MAXICHOP, SIKLUS 6: R-HIDAC 6