

	Pd Pomalidomid, Deksametazon		
	Hasta Adı/ TC No:		
	Tanı:		
	Boy		Kür Sayısı
Kilo		Hekim	
Düzeltilmiş Kilo		Kaşesi	
Yüzey Alanı			

İlaç	Gün	Tarih	Doz	Uygulama
Pomalidomid	İlk 21 gün		4 mg	oral
Deksametazon	1.gün		40 mg	oral
	8.gün			
	15.gün			
	22.gün			
28 günde bir uygulanır.				
Zoledronik asit 4 haftada bir 4 mg, ≥ 15 dakikada intravenöz				
Trimetoprim sulfometaksazol tb. 2x1 (haftada 2 gün) (tok)				
Flukonazol 200 mg 1x1 tablet (nötrojeni döneminde)				
Valasiklovir 500 mg 1x1 tablet (tok)				
Kalsiyum D vit eff tb 1x1 (hiperkalsemi yoksa)				
Lenalidomid yemekle bağımsız, her gün aynı saatte.				

IMiD tedavisi altında tromboz risk faktörleri		
Hasta kaynaklı risk faktörleri Enfeksiyon Cerrahi VTE öyküsü Aktif hastalık Kardiyovasküler hastalık İmmobilizasyon İleri yaş, obezite Trombofili Hiperviskozite		Tedavi kaynaklı risk faktörleri Yüksek doz deksametazon Eritropoetin Doksorubusin Hormon tedavisi Çoklu kemoterapi kombinasyonu
0-1	≥2	DMAH veya warfarin
Aspirin	DMAH veya warfarin	
Düşük riskli = hasta kaynaklı risk faktörü yok veya bir tane mevcut, tedavi kaynaklı risk faktörü		

yok;

Yüksek riskli = hasta kaynaklı risk faktörü birden fazla veya tedavi kaynaklı risk faktörü mevcut

VTE, venöz tromboemboli; DMAH, düşük moleküler ağırlıklı heparin

Sitopenide pomalidomid doz ayarlaması

Nötrofiller		Önerilen Tedavi Şekli	
ANS<0,5×10 ⁹ /L		Pomalidomide ara verilir ve haftalık tam kan sayımı bakılır. ANS ≥0,5×10 ⁹ /L ve ≥50×10 ⁹ /L olduğunda pomalidomide bir alt dozdan başlanır.	
FEN			
PLT <25×10 ⁹ /L			
-1 Doz	3 mg	-3 Doz	1 mg
-2 Doz	2 mg	-4 Doz	kes

Böbrek fonksiyonuna göre pomalidomid doz ayarlaması

Böbrek fonksiyonu (CrCl)	Doz ayarlaması
CrCl≥45 mL/dk	Doz ayarına gerek yok
CrCl<45 mL/dk (diyaliz gereken dahil)	3 mg başla. Tolere edebiliyorsa 4 mg'a yükseltilebilir. Dikkat pomalidomid diyalize giren hastalarda diyaliz sonrası verilmelidir çünkü diyaliz sırasında dolaşımdan atılabilir.

Zoledronik Asit Renal Doz Ayarlanması	
CrCl	Önerilen Doz
>60 mL/dk	4 mg
50-60 mL/dk	3.5 mg
40-<50 mL/dk	3.3 mg
30-<40 mL/dk	3 mg
<30 mL/dk	Kullanılmaz.