

 HEMATOLOJİ ÜNİVERSİTESİ	R-HYPERCVAD A (siklus 1-3)		
	Hasta Adı/ TC No:		
	Tanı:		
Boy		Kür Sayısı	
Kilo		Hekim	
Düzeltilmiş Kilo		Kaşesi	
Yüzey Alanı			

	Gün	Tarih	Doz	Uygulama
Rituksimab	1.gün		375 mg/m ²	İv . %0.9 sf veya %5 dekstroz içerisinde 1-4 mg/ml olacak şekilde dilue edilecek İlk inf 50 mg/saat alerjik reaksiyon gelişmezse her 30 dk da bir 50 mg/saat artırıp en fazla 400 mg/saate çıkılabilir
Siklofosfamid	2-3.gün (siklus 1,3,5,7)		2x300 mg/m ² 3 günde toplam 1800 mg/m ²	500 ml %0.9 SF içerisinde 2 saatte gidecek şekilde ,2 dozda,12saatte bir
Doksorubisin	5.6.7.gün		50 mg/m ²	Doksorubisin 150 cc %5 Dx içinde 1 saatlik iv infüzyonla uygulanır. Yüksek riskli hastalarda dekstrazoksan düşünülmelidir.
Vinkristin	4.ve 11. gün		1.4 mg /m ² (maksimum doz 2 mg)	50 ml %0.9 SF içinde 15 dakikada 2 doz (siklofosfamid bitiminden 12 saat sonra başlanır)
Mesna	Siklofosfamid başlamadan 1 saat önce başlanıp,		600 mg/m ²	1000 ml SF içerisinde devamlı infüzyon

	bitiminden 12 saat sonraya kadar			
Deksametazon	1-4.günler		40 mg/ gün	İv veya oral

21 günde bir uygulanır.

Premedikasyon

Hidrasyon :2500-3000 mL/gün ,100-125 ml/saat

Furosemid : 20-40 mg ,sıvı dengesi için

Allopurinol : 300 mg/ gün 1-7 . günler boyunca

Rituksimab öncesi premedikasyon:

Asetaminofen : 600-1000 mg po tedaviden 30-60 dakika önce

Difenhidramin: 25-30 mg po/iv

Rituksimab infüzyon reaksiyonu gelişirse

Asetaminofen : 400-600 mg oral 4-6 saatte bir (ateş için)

Difenhidramin : 25-50 mg oral yada iv 4-6 saatte bir (kaşıntı,hipotansiyon ,anjioödem için)

Meperidin :12.5-25 mg iv 10-20 dk da bir (titreme için)

Ciddi alerjik reaksiyonda ilaç infüzyonu kesilmeli ,

Hidrokortizon : 100 mg iv

H2 reseptör antagonisti: simetidin 300 mg /famotidin 20 mg / ranitidin 60 mg 15-30 dk

boyunca iv

Semptomlar azalnca infüzyon 25 mg/ saatten yakın monitörizasyon ile başlanılır.

İNTRATEKAL PROFİLAKSİ :

METOTREKSAT :2. GÜN 8 SİKLUS BOYUNCA 12 MG/DOZ

SİTARABİN :7.GÜN 8 SİKLUS BOYUNCA 100 MG/DOZ

FİLGRASTİM: 10 mcg/kg Wbc>3000/mm³ olana kadar ,son kemoterapiden 24 saat sonra başlanır.